



Instrukcja uprawy

str.

- 02 Strelitzia reginae - Strelcja królewska
- 03 Strelcja nicolai - Rajski ptak
- 04 Adenium obesum - Róża Pustyni
- 05 Jakaranda Mimozolistna
- 06 Adansonia digitata - Baobab afrykański
- 07 Delonix regia - Płomień Afryki
- 08 Ensete ventricosum - Banan abisyński
- 09 Musa balbisiana - Bananowiec
- 10 Musa yunnanensis – Yunnan
- 11 Trachycarpus fortunei - Palma mrozoodporna
- 12 Washingtonia filifera - Waszyngtonia nitkowata
- 13 Washingtonia robusta



Strelitzia reginae - Strelcja królewska

Strelitzia reginae – gatunek ozdobnej rośliny z rodziny strelcjowatych. Rodzima dla Republiki Południowej Afryki, gdzie występuje nad brzegami jezior, rzek około obszarów przybrzeżnych. Kwiaty koloru pomarańczowego i niebieskiego, przypominają ubarwienie ptaków rajszych, stąd potoczna nazwa Rajszy ptak. Strelcja swą botaniczną nazwę otrzymała na cześć żony króla Wielkiej Brytanii Jerzego III, Charlotty Mecklenburg-Strelitz. W naszym klimacie roślina wyłącznie do uprawy domowej. Latem może stać w ogrodzie w miejscu zacisznym i osłoniętym. Zimą najkorzystniejsza temperatura to około 10 °C i maksymalna ilość światła.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć dzień w termosie z ciepłą wodą 40°C. Rajszy ptaka obdzieramy z pomarańczowych piór aby pleśń się nie załęgła. Doniczkę ustawiamy w miejscu jasnym i słonecznym. Następnie wysiewamy na głębokość 1cm i zachowujemy temperaturę 24-27°C. Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego i perlitu, o pH 6 -7,8, obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, co by nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, a nie temperatury powietrza, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Stanowisko słoneczne bądź w półcieniu z dala od przeciągów i wiatru. Kiełkowanie od 3 tygodni do pięciu miesięcy. Wysiewana na jesieni może obudzić się na wiosnę/lato. Optymalna temperatura w okresie spoczynku (zima) 18°C. Podlewanie w okresie lata obfite. Nawozimy co 2 tygodnie nawozami z dużą dawką mikroelementów.

Szczegóły





Strelicja nicolai - Rajski ptak

Strelitzia nicolai – gatunek ozdobnej rośliny z rodziny strelicjowatych. Rodzima dla Republiki Południowej Afryki, gdzie występuje nad brzegami jezior, rzek około obszarów przybrzeżnych. Kwiaty koloru pomarańczowego i niebieskiego, przypominają ubarwienie ptaków rajskich, stąd potoczna nazwa Rajski ptak. Strelicja swą botaniczną nazwę otrzymała na cześć żony króla Wielkiej Brytanii Jerzego III, Charlotty Mecklenburg-Strelitz. W naszym klimacie roślina wyłącznie do uprawy domowej. Latem może stać w ogrodzie w miejscu zacisznym i osłoniętym. Zimą najkorzystniejsza temperatura to około 10 °C i maksymalna ilość światła.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć dzień w termosie z ciepłą wodą 40°C. Rajskiego ptaka obdzieramy z pomarańczowych piór aby pleśń się nie załęgła. Doniczkę ustawiamy w miejscu jasnym i słonecznym. Następnie wysiewamy na głębokość 1cm i zachowujemy temperaturę 24-27°C. Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego i perlitu, o pH 6-7,8, obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, co by nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, a nie temperatury powietrza, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Stanowisko słoneczne bądź w półcieniu z dala od przeciągów i wiatru. Kiełkowanie od 3 tygodni do pięciu miesięcy. Wysiewana na jesieni może obudzić się na wiosnę/lato. Optymalna temperatura w okresie spoczynku (zima) 18°C. Podlewanie w okresie lata obfite. Nawozimy co 2 tygodnie nawozami z dużą dawką mikroelementów.

Szczegóły






Adenium obesum - Róża Pustyni

Adenium arabskie, adenium opaste (Adenium obesum) gatunek rośliny rodziny toinowatych (Apocynaceae). Obszary naturalnego występowania to Afryka środkowa północno-wschodnia oraz Półwysep Arabski. Adenium to sukulent osiągający naturalnych warunkach nawet 3 metry. Liście mięsiste większości opadają zimą. Kwiaty różnobarwne (zależy od odmiany), trąbkowate, długości 4-5cm. Sok mleczny rośliny jest silnie trujący, może też podrażnić skórę. strefie klimatu umiarkowanego uprawiany jako roślina doniczkowa. Walorem ozdobnym jest efektowny pokrój piękne kwiaty.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem moczymy cieplej (35 stopni C) wodzie. Następnie wysiewamy do gotowej ziemi dla kaktusów sukulentów. Może być dodatkiem perlitu, bądź włókna kokosowego. Głębokość 1cm - nie przygniatać. Zapewniamy stałą temperaturę na poziomie 23-26 stopni C. Kielkowanie od 2 tygodni do dwóch miesięcy. Roślina czuje się dobrze bezpośrednim nasłonecznieniu, zimą powinna stać miejscu ciemnym chłodnym. Latem może przebywać na zewnątrz miejscu słonecznym, ale osłoniętym od wiatru. Wymaga podlewania regularnego okresie od kwietnia do października, okresie zimowym podlewanie należy ograniczyć. **ROŚLINA TRUJĄCA.**

Szczegóły





Jakaranda Mimosolistna

Gatunek tropikalnego drzewa pochodzącego z Ameryki Południowej. Głównie sadzona jako drzewo ozdobne i nie ma się co dziwić podczas kwitnienia wygląda oszałamiająco! Nazwa jakaranda pochodzi z języka guarani i znaczy „pachnące”. Dorasta do 20 m wysokości, kwiaty sięgają do 4 cm długości koloru niebiesko-fioletowego. Roczne drzewka o zdrewniałym pniu można śmiało przycinać, bardzo ładnie się rozgałęziają.

Uprawa

Przed wysianiem nasiona należy namoczyć przez około 6 godzin w letniej wodzie. Następnie wysiewamy powierzchnie przysypując milimetrową warstwą ziemi (ziemia o pH 5.5- 7.5). Roślina preferuje miejsca ciepłe i słoneczne. Zachować stałą temperaturę 22C w dzień. W naszym klimacie na zewnątrz może być przenoszona wyłącznie w okresie letnim. Kiełkowanie następuje od 30 do 90 dni.

Szczegóły





Adansonia digitata - Baobab afrykański

Baobab afrykański, baobab właściwy (*Adansonia digitata*) – drzewo z rodziny ślazowatych, rodzime dla terenów tropikalnej i subtropikalnej Afryki. Baobaby osiągają do 18 m wysokości za to ich obwód może przekroczyć 30 m. Kora gruba, wydziela gumową substancję. Pień jest wypełniony mięszem wodnym który może zawierać do 100 tysięcy litrów wody. Kwiaty białe zwisające do długich szypułek osiągają do 20 cm. Baobab ma wiele zastosowań w sztuce kulinarnej. Korzenie młodych siewek są jadalne, pędy smakują niczym szparagi. Liście bogate w witaminę C, natomiast miąższ owoców służy do wyrobów napoi i zup.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem delikatnie matujemy pilnikiem do paznokci moczymy 2 dni gorącej wodzie (40 stopni C). Można zastosować także zamiast moczenia płukanie bardzo gorącą wodą (około 70stopni C). Tak przygotowane nasiona wkładamy do substratu na głębokość do 2cm. Gleba dodatkiem perlitu drobnoziarnistego piasku będzie dobrym rozwiązaniem. Stosujemy doniczki głębokie – minimum 9cm. Zachować temperaturę 25-30 stopni C, ziemia stale lekko wilgotna. Stanowisko słoneczne. Kielkowanie następuje ciągu 5-150 dni. Wszystko zależy od warunków kaprysu nasion.

Szczegóły





Delonix regia - Płomień Afryki

Delonix regia roślina tropikalna rodzima dla lasów Madagaskaru gdzie jest gatunkiem zagrożonym. Uprawiana wielu krajach klimacie tropikalnych jako roślina ozdobna nas jedynie do uprawy domowej. Płomień Afryki dorasta do 9 m wysokości zakwita pomarańczowo - czerwonymi kwiatami które mają średnicę do 15 cm. Kwitnie od wiosny do lata, okresie suszy traci liście. Na Karaibach drewna delonix robi się instrumenty muzyczne – marakasy.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy namoczyć w gorącej wodzie przez 48h (termos) następnie możemy lekko je spłówać pilnikiem do paznokci. Wysiewamy poziomo na głębokość 1 cm do ziemi o pH 6,1-7,5. Stanowisko słoneczne, zachować stałą temperaturę 25C. Kiełkowanie następuje od 2 do 16 tygodni.

Szczegóły






Ensete ventricosum - Banan abisyński

Ensete ventricosum, inaczej banan abisyński, jest zimozieloną rośliną pochodzącą z subtropikalnych części świata. Jego wielkość waha się w granicach 4-6 m. To niesamowite drzewo bananowe może występować tradycyjnym zielonym ulistnieniem, bordowym żyłkowaniem lub odcieniami czerwieni. Liście przypominają kształtem gigantyczne wiosty. Naturalnym środowisku osiągają 6 m długości, 1,5 szerokości. Kwiaty są białe, pojawiają się licznie na ogromnych kwiatostanach. Roślina uprawiana jest raczej jako ozdobna niż użytkowa. Łodygi liściowe nadają się do jedzenia, ale owoce nie są smaczne. Wytrzymuje temperatury do -6°C.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy lekko spławić, a następnie wrzucić do ciepłej wody (początkowa temperatura 30 stopni C) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno przyspieszyć kiełkowanie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy. Wszystko zależy od warunków, jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna, wodę z dodatkiem włókna kokosowego, o neutralnym pH obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy, aby zdejmować ją raz na dzień, żeby nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe, jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych bananowców nie nawozimy (takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin zielonych. Bananowiec zimujemy w temperaturze ok. 8°C (+/- 5). Możliwe usychanie części liści.

Szczegóły





Musa balbisiana - Bananowiec

Musa balbisiana var. balbisiana - dziki gatunek banana pochodzący ze wschodniej Azji. Po raz pierwszy został naukowo opisany w 1820 r. przez włoskiego botanika Luigiego Aloysiusa Colla. Pokrój bardziej wyprostowany niż większość bananowców. Liście bujne, bardzo ozdobne. Owoce koloru między zielonym a niebieskim. Uważane za niejadalne ze względu na dużą ilość nasion. W naszym klimacie do uprawy doniczkowej.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy lekko spłówać, a następnie wrzucić do ciepłej wody (początkowa temperatura 30 stopni C) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno przyspieszyć kiełkowanie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy. Wszystko zależy od warunków jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego, o neutralnym pH obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, co by nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych bananowców nie nawozimy (takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin zielonych. Bananowiec zimą w temperaturze ok. 8°C (+/- 5). Możliwe usychanie części liści.

Szczegóły





Musa yunnanensis – Yunnan

Musa yunnanensis, powszechnie znany jako Bananowiec Yunnan lub Banan z dzikiego lasu. Głównie spotykany w górskich lasach tropikalnych, jest odporna na cień i mróz, a także wrażliwa na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Największe osobniki w warunkach naturalnych osiągają ponad 5m wysokości. Górna powierzchnia liści jest niebieskawa, choć ich spód jest czerwony. Owocami żywią się słonie, nietoperze i różne ptaki. Jedna z najbardziej mrozoodpornych odmian musa.

Uprawa

Nasiona przed wysiewem należy lekko spłówać, a następnie wrzucić do ciepłej wody (początkowa temperatura 30 stopni C) na 24-48h. Przez ten czas skorupka nasion powinna zmięknąć, a to powinno przyspieszyć kiełkowanie. Czas kiełkowania jest różny od 3 tygodni do wielu miesięcy. Wszystko zależy od warunków jakie zapewnimy. Nasiona wysiewamy na 2-3cm głębokości. Ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę z dodatkiem włókna kokosowego, o neutralnym pH obowiązkowo z warstwą drenażu. Można ją wyprażyć w piekarniku w naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów i szkodników. Około 15 minut w temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, aby nie zaległa się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. W okresie jesieni i zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne w okresie wiosny, lata. Gleba stale wilgotna, ale nie mokra. Liście można spryskiwać, byle nie w pełnym słońcu. Małych bananowców nie nawozimy (takie 2-3 miesiące). Można w okresie wiosny-lata użyć nawozu do roślin zielonych. Bananowiec zimą w temperaturze ok. 8°C (+/- 5). Możliwe usychanie części liści.

Szczegóły





Trachycarpus fortunei - Palma mrozoodporna

Palma mrozoodporna pochodzi z górskich terenów Chin. Zazwyczaj spotykana na wysokościach powyżej 2000m n.p.m. Jest to jedna z najlepiej znoszących mróz palm, może wytrzymać spadek temperatury nawet do -25 stopni C. Obecnie coraz częściej spotykana w polskich ogrodach. Młodsze okazy należy okrywać na zimę.

Uprawa

Przed wysiewem nasiona należy lekko spiłować, następnie wymoczyć ciepłej wodzie (40 stopni C, zmieniać co 12h) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę dodatkiem włókna kokosowego perlitu, obowiązkowo warstwą drenażu będzie sam raz. Można ją wyprażyć piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. Około 15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba leciutko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, żeby nie zaległa się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. okresie jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne okresie wiosny, lata. Zachowujemy temperaturę 25°C. Kiełkowanie trwa od 1-7 miesięcy. Obowiązkowo pamiętamy wysokiej doniczce do palm. Stanowisko pełnym słońcem lub półcieniu. Mrozoodporna: -25°C

Szczegóły





Washingtonia filifera - Waszyngtonia nitkowata

Rodzima dla pustynnych oaz Centralnej, południowo-zachodniej Arizony i północno-zachodniego Meksyku. Jest to jedna z najszybciej rosnących palm osiągająca 18 metrów wysokości choć zdarzają się okazy po 25 metrów. Obumierające liście dookoła kadłuba tworzą tak zwaną spódnicę która dostarcza mikrohabitatów wielu bezkręgowcom. Mrozoodporność sięga do -18C

Uprawa

Przed wysiewem nasiona należy lekko spławić, następnie wymoczyć w ciepłej wodzie (30 stopni C) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę dodatkami włókna kokosowego perlitu, obowiązkowo warstwę drenażu będzie sam raz. Można ją wyprażyć w piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. Około 15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba lekko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, żeby nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. okresie jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne okresie wiosny, lata. Zachowujemy temperaturę 25°C. Kiełkowanie trwa od 2 tygodni do 7 miesięcy. Obowiązkowo pamiętamy wysokiej doniczce do palm. Stanowisko pełnym słońcu.

Szczegóły





Washingtonia robusta

Rodzima dla pustynnych oaz Centralnej, południowo-zachodniej Arizony i północno-zachodniego Meksyku. Jest to jedna z najszybciej rosnących palm osiągnąca 18 metrów wysokości choć zdarzają się okazy po 25 metrów. Obumierające liście dookoła kadtuba tworzą tak zwaną spódnicę która dostarcza mikrohabitatów wielu bezkręgowcom. Mrozoodporność sięga do -18C.

Uprawa

Przed wysiewem nasiona należy lekko spiłować, następnie wymoczyć ciepłej wodzie (30 stopni C) przez 48h. Wysiewamy na głębokość 3-krotną nasiona. Kupno gotowej ziemi do palm będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli nie mamy jej pod ręką to ziemia lekka, dobrze przepuszczalna wodę dodatkiem włókna kokosowego perlitu, obowiązkowo warstwę drenażu będzie sam raz. Można ją wyprażyć w piekarniku naczyniu żaroodpornym, aby pozbyć się wszelkich grzybów szkodników. Około 15 minut temperaturze 150 stopni C, gleba lekko wilgotna. Piekarnik później nie pachnie za fajnie. Na doniczkę nakładamy mini szklarenkę, albo torebkę foliową. Pamiętajmy aby zdejmować ją raz na dzień, aby nie załęgła się pleśń. Taka osłonka pozwoli zachować stale lekko wilgotną glebę. okresie jesieni zimy parapety domowe nie są zawsze tak ciepłe jakby się wydawało. Pamiętajmy, że nasiona do kiełkowania potrzebują odpowiedniej temperatury GLEBY, dlatego niezbędna może okazać się podgrzewana mata. Podlewanie regularne okresie wiosny, lata. Zachowujemy temperaturę 25°C. Kiełkowanie trwa od 2 tygodni do 7 miesięcy. Obowiązkowo pamiętamy wysokiej doniczce do palm. Stanowisko pełnym słońcu.

Szczegóły

